

ABIRATERONE

+ DOCETAXEL

+ ADT (terapia di deprivazione androgenica)

CONTATTI UTILI



Farmacia: _____

Reparto: _____

SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO

Assuma Abiraterone ogni giorno, senza giorni di pausa, salvo diversa indicazione del medico.

TERAPIA CONTINUATIVA

OGNI GIORNO

ALLA STESSA ORA

QUANTO?

___ COMPRESSE
da _____ mg

QUANDO?

1 VOLTA AL
GIORNO

A CHE ORA?

SEMPRE ALLA
STESSA ORA

CON IL CIBO?

SENZA CIBO
(almeno un'ora prima o
almeno due ore dopo il pasto)



IN REPARTO

Infusione di Docetaxel in reparto di oncologia.

TERAPIA OGNI 21 GIORNI

GIORNO 1

GIORNO 21



- Le compresse devono essere assunte intere. Non masticare, non frantumare, non dividere le compresse.
- Abiraterone è somministrato in combinazione con la **terapia di deprivazione androgenica (ADT)**, secondo le indicazioni del medico.
- Abiraterone è assunto con un medicinale chiamato **prednisone**. Prenda prednisone seguendo esattamente le istruzioni del medico.



- Se dimentica una dose, prenda la dose usuale il giorno successivo. Se dimentica la dose per più di un giorno, contatti il medico.
- Se prende più ABIRATERONE di quanto previsto, contatti il medico appena possibile e prima della dose successiva.

INFORMAZIONI UTILI



Contatti il medico o il farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori.



Il farmaco non influenza o influenza in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o usare macchinari.



Gli uomini che usano questo farmaco devono usare un metodo contraccettivo efficace in caso di rapporti sessuali con una donna in età fertile o in gravidanza, come un preservativo.

COSA FARE IN CASO DI...

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire a domicilio, contatti il suo team di cura.

❖ Ipertensione

Controlli regolarmente la pressione e faccia attenzione a sintomi come mal di testa, capogiri o ronzii alle orecchie. Contatti il medico se i valori restano per più giorni sopra i valori abituali.

❖ Diarrea

Bere spesso per reintegrare i liquidi e fare piccoli pasti con cibi semplici e leggeri. Eviti cibi grassi o piccanti, alcol e caffeina. Prenda i farmaci contro la diarrea solo su indicazione del medico. Contatti il medico se ha più di 3 scariche al giorno o se la diarrea dura oltre 24 ore nonostante i farmaci. Non assumere integratori che contengono *Saccharomyces boulardii*.

❖ Edema/Gonfiore alle articolazioni

Se nota gonfiore o pesantezza insolita a braccia o gambe, informi il medico. Per ridurre il fastidio può tenere le gambe sollevate e indossare abiti comodi e calzini non stretti; non assumere integratori per la circolazione/salute dei vasi sanguigni senza aver consultato il medico o il farmacista.

❖ Bocca infiammata o afte

Lavare i denti dopo i pasti con uno spazzolino morbido (da cambiare ogni tre settimane) e fare uno sciacquo con acqua e bicarbonato. Se compaiono bruciore, arrossamento o afte, scegliere cibi morbidi e tiepidi, evitando quelli piccanti, acidi o molto salati, alcol e fumo, e informa il medico. Se necessario, usi la cannuccia per bere.

❖ Perdita capelli

I capelli potrebbero diradarsi e cadere ma ricresceranno al termine del trattamento o, in alcuni casi, anche durante il trattamento. La loro consistenza e il loro colore potrebbe apparire diverso. Trattare i capelli con delicatezza: usi uno shampoo delicato, li lavi meno spesso, li spazzola senza tirare e usi il phon a temperatura moderata. Eviti tinte, decolorazioni, permanenti e altri trattamenti aggressivi; non assumere integratori per i capelli/unghie senza aver consultato il medico o il farmacista.

Contattare il Medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti (dopo 4 scariche/episodi di vomito nell'arco della giornata).
- Ha difficoltà a respirare, dolore toracico e palpitazioni.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha tachicardia o battito cardiaco irregolare, pressione sanguigna sopra i 170 mmHg.
- Ha febbre sopra i 38,5°C, dolore a urinare, tosse persistente.
- Aumenta improvvisamente di peso o nota gonfiore alle gambe/braccia.

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



Questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.



Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.