

# ABIRATERONE

## CONTATTI UTILI



Farmacia: \_\_\_\_\_

Reparto: \_\_\_\_\_

## SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

### COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO

Assuma il farmaco ogni giorno, senza giorni di pausa, salvo diversa indicazione del medico.

#### TERAPIA CONTINUATIVA

OGNI GIORNO

ALLA STESSA ORA

#### QUANTO?

\_\_\_ COMPRESSE  
da \_\_\_\_\_ mg

#### QUANDO?

1 VOLTA AL  
GIORNO

#### A CHE ORA?

SEMPRE ALLA  
STESSA ORA

#### CON IL CIBO?

SENZA CIBO  
(almeno un'ora prima o  
almeno due ore dopo il pasto)



- Le compresse devono essere assunte intere. Non masticare, non frantumare, non dividere le compresse.
- Abiraterone è assunto con un medicinale chiamato **prednisone**. Prenda prednisone seguendo esattamente le istruzioni del medico.



- Se dimentica una dose, prenda la dose usuale il giorno successivo. Se dimentica la dose per più di un giorno, contatti il medico.
- Se prende più ABIRATERONE di quanto previsto, contatti il medico appena possibile e prima della dose successiva.

## INFORMAZIONI UTILI



**Contatti il medico o il farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori.**



Il farmaco non influenza o influenza in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o usare macchinari.



Gli uomini che usano questo farmaco devono usare un metodo contraccettivo efficace in caso di rapporti sessuali con una donna in età fertile o in gravidanza, come un preservativo.

# COSA FARE IN CASO DI...

*Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.*

*La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire a domicilio, contatti il suo team di cura.*

## ❖ Ipertensione

Controlli regolarmente la pressione e faccia attenzione a sintomi come mal di testa, capogiri o ronzii alle orecchie. Contatti il medico se i valori restano per più giorni sopra i valori abituali.

## ❖ Diarrea

Bere spesso per reintegrare i liquidi e fare piccoli pasti con cibi semplici e leggeri. Eviti cibi grassi o piccanti, alcol e caffeina. Prenda i farmaci contro la diarrea solo su indicazione del medico. Contatti il medico se ha più di 3 scariche al giorno o se la diarrea dura oltre 24 ore nonostante i farmaci. Non assumere integratori che contengono *Saccharomyces boulardii*.

## ❖ Edema/Gonfiore alle articolazioni

Se nota gonfiore o pesantezza insolita a braccia o gambe, informi il medico. Per ridurre il fastidio può tenere le gambe sollevate e indossare abiti comodi e calzini non stretti; non assumere integratori per la circolazione/salute dei vasi sanguigni senza aver consultato il medico o il farmacista.

## ❖ Infezioni urinarie

Bere abbondantemente, salvo diversa indicazione, e contatti il medico se avverte difficoltà o bruciore durante la minzione (quando fa pipì). Non assumere integratori o altri prodotti per le vie urinarie senza consultare il medico.

### Contattare il medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti (dopo 4 scariche/episodi di vomito nell'arco della giornata).
- Ha difficoltà a respirare, dolore toracico e palpitazioni.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha tachicardia o battito cardiaco irregolare, pressione sanguigna sopra i 170 mmHg.
- Ha febbre sopra i 38,5°C, dolore a urinare, tosse persistente.
- Aumenta improvvisamente di peso o nota gonfiore alle gambe/braccia.

## INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



Questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.



Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.