

ALECENSA

(*alectinib*)

CONTATTI UTILI

Farmacia: _____


Reparto: _____



SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO

Assuma il farmaco ogni giorno, senza giorni di pausa, salvo diversa indicazione del medico.



QUANTO?	QUANDO?	A CHE ORA?	CON IL CIBO?
___ CAPSULE da 150 mg	2 VOLTE AL GIORNO	SEMPRE ALLA STESSA ORA	A COLAZIONE E A CENA   

Le capsule rigide devono essere ingerite intere, non devono essere aperte, né disciolte e devono essere assunte in corrispondenza dei pasti.

Se dimentica di prendere Alecensa:

- Se mancano più di 6 ore alla dose successiva: prenda la dose dimenticata non appena se ne ricorda.
- Se mancano meno di 6 ore alla dose successiva: salti la dose dimenticata. Quindi prenda la dose successiva all'ora stabilita. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

In caso di vomito dopo la somministrazione di una dose di Alecensa, non prenda un'altra dose e assuma la successiva all'orario previsto.

Se prende più ALECENSA di quanto previsto, contatti il medico appena possibile e prima della dose successiva.

INFORMAZIONI UTILI



Contatti il medico o il farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori.

Non assuma erba di San Giovanni/ipérico durante il trattamento.

Questo farmaco contiene lattosio.



Questo farmaco altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Si raccomanda cautela nel guidare veicoli o nell'usare macchinari.



Le donne e gli uomini che usano questo farmaco devono usare un metodo contraccettivo efficace, come un metodo di barriera o un altro metodo altamente affidabile per prevenire una gravidanza per almeno 3 mesi dopo la fine della terapia.

Il farmaco non deve essere usato durante la gravidanza o l'allattamento.

COSA FARE IN CASO DI...

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire a domicilio, contatti il suo team di cura.

❖ Diarrea

Bere spesso per reintegrare i liquidi e fare piccoli pasti con cibi semplici e leggeri. Eviti cibi grassi o piccanti, alcol e caffeina. Prenda i farmaci contro la diarrea solo su indicazione del medico. Contatti il medico se ha più di 3 scariche al giorno o se la diarrea dura oltre 24 ore nonostante i farmaci. Non assumere integratori che contengono *Saccharomyces boulardii*.

❖ Nausea e vomito

Bere a piccoli sorsi e fare pasti piccoli e frequenti, scegliendo cibi semplici e leggeri. Se vomita dopo aver preso il farmaco, non lo riprenda e assuma la dose successiva all'orario previsto. Non usare integratori contro la nausea senza consultare il medico o il farmacista.

❖ Eruzione cutanea

Protegga la pelle dal sole, evitando l'esposizione nelle ore più calde, usando indumenti protettivi e una protezione solare 50+. Per l'igiene usi acqua tiepida, detergenti delicati senza alcol e creme idratanti; eviti di grattarsi e segua le indicazioni dell'équipe curante se i sintomi peggiorano. Eviti l'uso di smalto per unghie e tenga le unghie limate, non appuntite e non troppo corte.

❖ Edema/Gonfiore alle articolazioni

Se nota gonfiore o pesantezza insolita a braccia o gambe, informi il medico. Per ridurre il fastidio può tenere le gambe sollevate e indossare abiti comodi e calzini non stretti; non assumere integratori per la circolazione/salute dei vasi sanguigni senza aver consultato il medico o il farmacista.

Contattare il medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti, dopo 4 scariche/episodi di vomito nella giornata.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha febbre sopra 38,5 °C, tosse persistente o dolore a urinare.
- Ha difficoltà a respirare, dolore toracico, palpitazioni, battito irregolare o svenimento.
- Ha respiro corto, tosse, affanno o braccia/gambe molto gonfie.
- Ha grave eruzione cutanea, desquamazione della pelle, dolore/rossore agli occhi o problemi alla vista.

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.



Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.