

ALUNBRIG

(brigatinib)

CONTATTI UTILI




Farmacia: _____

Reparto: _____

SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO

Assuma il farmaco ogni giorno, senza giorni di pausa, salvo diversa indicazione del medico.



QUANTO?	QUANDO?	A CHE ORA?	CON IL CIBO?
1 COMPRESSA da 90 mg per 7 giorni, poi 1 da 180 mg per 21 giorni	1 VOLTA AL GIORNO	SEMPRE ALLA STESSA ORA	CON O SENZA CIBO



- Alunbrig è per uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere e con acqua. Alunbrig può essere assunto con o senza cibo.
- Se dimentica una dose o vomita dopo una dose, **NON** deve assumere una dose aggiuntiva; la dose successiva deve essere somministrata al tempo stabilito.
- In caso di vomito dopo la somministrazione di una dose di ALUNBRIG, assuma la dose successiva all'orario stabilito.
- Se prende più ALUNBRIG di quanto previsto, contatti il medico appena possibile e prima della dose successiva.



INFORMAZIONI UTILI



Contatti il medico o il farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori.

Non assuma erba di San Giovanni/iperico o succo di pompelmo durante il trattamento.

Questo farmaco contiene LATTOSIO



Questo farmaco altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Si raccomanda cautela nel guidare veicoli o nell'usare macchinari.



Le donne e gli uomini che usano questo farmaco devono usare un metodo contraccettivo efficace, come un metodo di barriera o un altro metodo altamente affidabile per prevenire una gravidanza per almeno 4 mesi dopo la fine della terapia. Il farmaco non deve essere usato durante la gravidanza o l'allattamento.

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire a domicilio, contatti il suo team di cura.

❖ Diarrea

Bere spesso per reintegrare i liquidi e fare piccoli pasti con cibi semplici e leggeri. Eviti cibi grassi o piccanti, alcol e caffeina. Prenda i farmaci contro la diarrea solo su indicazione del medico. Contatti il medico se ha più di 3 scariche al giorno o se la diarrea dura oltre 24 ore nonostante i farmaci. Non assumere integratori che contengono *Saccharomyces boulardii*.

❖ Ipertensione

Controlli regolarmente la pressione e faccia attenzione a sintomi come mal di testa, capogiri o ronzii alle orecchie. Contatti il medico se i valori restano per più giorni sopra i valori abituali.

❖ Eruzione cutanea

Protegga la pelle dal sole, evitando l'esposizione nelle ore più calde, usando indumenti protettivi e una protezione solare 50+. Per l'igiene usi acqua tiepida, detergenti delicati senza alcol e creme idratanti; eviti di grattarsi e segua le indicazioni dell'équipe curante se i sintomi peggiorano. Eviti l'uso di smalto per unghie e tenga le unghie limate, non appuntite e non troppo corte.

❖ Dolori articolari e muscolari e mal di testa

Per dolori muscolari o articolari può essere utile mantenere, se possibile, una regolare attività fisica (esempio una camminata di mezz'ora) e seguire un'alimentazione equilibrata. Assuma gli antidolorifici o integratori di magnesio e potassio solo se consigliati dal medico o dal farmacista e contatti l'équipe curante se i sintomi persistono.

Contattare il medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti, dopo 4 scariche/episodi di vomito nella giornata.
 - Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
 - Ha febbre sopra 38,5 °C, tosse persistente o dolore a urinare.
 - Ha difficoltà a respirare, dolore toracico, palpitazioni, battito irregolare o svenimento.
 - Ha respiro corto, tosse, affanno o braccia/gambe molto gonfie.
 - Ha grave eruzione cutanea, desquamazione della pelle, dolore/rossore agli occhi.
- Ha disturbi visivi come lampi di luce, visione offuscata o fastidio agli occhi provocato dalla luce

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare per la conservazione.



Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.