

TAFINLAR

((dabrafenib))

CONTATTI UTILI

Farmacia: _____

Reparto: _____



SCHEMA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO



Assuma il farmaco ogni giorno, senza giorni di pausa, salvo diversa indicazione del medico.

TERAPIA CONTINUATIVA

OGNI GIORNO

ALLA STESSA ORA

2
COMPRESSE
da ____ mg AL
GIORNO:



1

+



1



AL MATTINO



ALLA SERA



Assumere almeno un'ora prima, o almeno 2 ore dopo un pasto.



Con un bicchiere d'acqua



Dabrafenib è usato in combinazione con **trametinib**

Le compresse devono essere assunte INTERE.

Non masticare, non frantumare, non dividere le compresse.

Nel caso di difficoltà ad assumere le compresse intere contattare il medico o il farmacista.

Se dimentica una dose di Tafinlar e:

- sono passate meno di 6 ore: la prenda non appena se lo ricorda.
- sono passate più di 6 ore: salti quella dose e prenda la dose successiva alla solita ora. Non prenda una dose doppia per compensare la dose dimenticata.



Se prende più Tafinlar di quanto deve: contatti il medico appena possibile e prima di prendere la dose successiva.

INFORMAZIONI UTILI



Alcuni medicinali possono avere effetto sul funzionamento di Tafinlar o possono aumentare la probabilità che lei abbia effetti indesiderati. Contattare il medico o il farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori. Non assuma erba di San Giovanni/iperico durante il trattamento.



Non guidi né usi macchinari se avverte capogiri, stanchezza, sonnolenza, vertigini o visione offuscata dopo avere assunto il farmaco.



Le donne e gli uomini che usano questo farmaco devono usare un metodo contraccettivo efficace, come un metodo di barriera. **I contraccettivi potrebbero non funzionare bene mentre sta prendendo Tafinlar.** Il farmaco non deve essere usato durante la gravidanza o l'allattamento.



Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire autonomamente, contatti il suo team di cura.

❖ **Sanguinamento**

Cerchi di evitare traumi, di soffiare il naso delicatamente e usare uno spazzolino a setole morbide. Controlli la comparsa di lividi, petecchie o perdite di sangue da naso o bocca e non assumere farmaci di propria iniziativa, in particolare antinfiammatori, senza aver consultato il medico.

❖ **Febbre**

Bere spesso e non si copra eccessivamente. Se la temperatura supera 38 °C, segua le indicazioni ricevute dal medico per l'assunzione di paracetamolo. Non assumere altri farmaci di propria iniziativa.

❖ **Dolori articolari e muscolari e mal di testa**

Per dolori muscolari o articolari può essere utile mantenere, se possibile, una regolare attività fisica (esempio una camminata di mezz'ora) e seguire un'alimentazione equilibrata. Assuma gli antidolorifici o integratori di magnesio e potassio solo se consigliati dal medico o dal farmacista e contatti l'équipe curante se i sintomi persistono.

❖ **Eruzione cutanea, prurito, dermatite, fotosensibilità**

Protegga la pelle dal sole, evitando l'esposizione nelle ore più calde, usando indumenti protettivi e una protezione solare 50+. Per l'igiene usi acqua tiepida, detergenti delicati senza alcol e creme idratanti; eviti di grattarsi e segua le indicazioni dell'équipe curante se i sintomi peggiorano. Eviti l'uso di smalto per unghie e tenga le unghie limate, non appuntite e non troppo corte.

Contattare il Medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti (dopo 4 scariche/episodi di vomito nell'arco della giornata).
- Ha mal di testa, confusione mentale, problemi visivi.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha dolore muscolare/osseo che non permette di svolgere le attività quotidiane.
- Ha febbre sopra i 38,5°C, dolore a urinare, tosse persistente.
- Le è capitato di perdere coscienza o di svenire.
- Rossore/irritazione agli occhi, visione offuscata, dolore agli occhi / cambiamento della vista

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



Questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.



Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.

