

ERLEADA

(darolutamide)

CONTATTI UTILI



Farmacia: _____

Reparto: _____

SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO

Assuma il farmaco ogni giorno, senza giorni di pausa, salvo diversa indicazione del medico.

TERAPIA CONTINUATIVA

OGNI GIORNO

ALLA STESSA ORA

COMPRESSE
da 300 mg AL
GIORNO:



+



AL MATTINO



ALLA SERA



Durante il pasto



Con un bicchiere d'acqua



- Le compresse devono essere assunte intere. Non masticare, non frantumare, non dividere le compresse.



- Se dimentica una dose, prenda la dose non appena se lo ricorda e prima della successiva dose programmata. Non assuma due dosi contemporaneamente per compensare la dose dimenticata.
- Se prende più DAROLUTAMIDE di quanto previsto, può assumere la dose successiva come programmato. Informi il Medico.

INFORMAZIONI UTILI



Contatti il Medico o il Farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori.



Il farmaco non influenza o influenza in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o usare macchinari.



Gli uomini che usano questo farmaco devono usare durante il trattamento e per 1 settimana dopo il trattamento un metodo contraccettivo efficace in caso di rapporti sessuali con una donna in età fertile o in gravidanza, come un preservativo.

COSA FARE IN CASO DI...

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire a domicilio, contatti il suo team di cura.

❖ Affaticamento/Astenia

È normale che durante la terapia si possa sentire affaticato/a. Organizzi la giornata alternando attività e pause, riposi quando ne sente il bisogno e cerchi di mantenere un sonno regolare, una buona alimentazione e una corretta idratazione. Se la stanchezza è marcata, eviti di guidare o usare macchinari.

❖ Eruzione cutanea, dermatite

Protegga la pelle dal sole, evitando l'esposizione nelle ore più calde, usando indumenti protettivi e una protezione solare 50+. Per l'igiene usi acqua tiepida, detergenti delicati senza alcol e creme idratanti; eviti di grattarsi e segua le indicazioni dell'équipe curante se i sintomi peggiorano. Eviti l'uso di smalto per unghie e tenga le unghie limate, non appuntite e non troppo corte.

❖ Ipertensione

Controlli regolarmente la pressione e faccia attenzione a sintomi come mal di testa, capogiri o ronzii alle orecchie. Contatti il medico se i valori restano per più giorni sopra i valori abituali.

❖ Abbassamento dei globuli bianchi

Curare con attenzione l'igiene personale e orale, usando uno spazzolino morbido. Segnalare eventuali macchie bianche/afte in bocca. Disinfettare bene le ferite. Contatti subito il reparto di oncologia/ematologia o la guardia medica se la temperatura supera 38 °C.

Contattare il Medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti (dopo 4 scariche/episodi di vomito nell'arco della giornata).
- Ha difficoltà a respirare, dolore toracico e palpitazioni.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha tachicardia o battito cardiaco irregolare, pressione sanguigna sopra i 170 mmHg.
- Ha febbre sopra i 38,5°C, dolore a urinare, tosse persistente.
- Hai dolore muscolare/osseo che non permette di svolgere le attività quotidiane.

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



Questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.



Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.