

DASATINIB

CONTATTI UTILI

Farmacia: _____

Reparto: _____



SCHEMA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO

Assuma il farmaco ogni giorno, senza giorni di pausa, salvo diversa indicazione del medico.

TERAPIA CONTINUATIVA

OGNI GIORNO

ALLA STESSA ORA

QUANTO?	QUANDO?	A CHE ORA?	CON IL CIBO?
1 COMPRESSA da _____ mg	1 VOLTA AL GIORNO	AL MATTINO O ALLA SERA	CON O SENZA CIBO

Le compresse devono essere assunte INTERE.

Non masticare, non frantumare, non dividere le compresse.

Nel caso di difficoltà ad assumere le compresse intere contattare il medico o il farmacista

Se dimentica una dose: Prenda la successiva dose programmata alla solita ora.

Non assuma una dose doppia per compensare la dose dimenticata.

Se prende più Dasatinib di quanto previsto: contatti il medico appena possibile e prima di prendere la dose successiva.



INFORMAZIONI UTILI



Contattare il medico o il farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori.

Non assumere pompelmo o succo di pompelmo durante il trattamento.

Non assumere prodotti contenenti Erba di San Giovanni (iperico) durante il trattamento.

Non assumere farmaci per l'acidità di stomaco 2 ore prima e 2 ore dopo aver assunto Dasatinib



Non guidi né usi macchinari se avverte capogiri, stanchezza, sonnolenza, vertigini o visione offuscata dopo avere assunto il farmaco.



Le donne e gli uomini che usano questo farmaco devono usare un metodo contraccettivo efficace, come un metodo di barriera o un altro metodo altamente affidabile per prevenire una gravidanza. Il farmaco non deve essere usato durante la gravidanza o l'allattamento.

COSA FARE IN CASO DI...

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire a domicilio, contatti il suo team di cura.

❖ Nausea, vomito e perdita dell'appetito

Bere a piccoli sorsi durante la giornata e fare pasti piccoli e frequenti con cibi secchi e leggeri, evitando alimenti grassi, dolci o speziati. Prendere i farmaci contro il vomito (antiemetici) che le hanno prescritto e contatti il medico se nausea o vomito persistono anche dopo aver preso i farmaci antiemetici. Non usare integratori contro la nausea senza consultare il medico o il farmacista.

❖ Diarrea

Bere spesso per reintegrare i liquidi e fare piccoli pasti con cibi semplici e leggeri. Eviti cibi grassi o piccanti, alcol e caffeina. Prenda i farmaci contro la diarrea solo su indicazione del medico. Contatti il medico se ha più di 3 scariche al giorno o se la diarrea dura oltre 24 ore nonostante i farmaci. Non assumere integratori che contengono *Saccharomyces boulardii*.

❖ Dolori articolari e muscolari e mal di testa

Per dolori muscolari o articolari può essere utile mantenere, se possibile, una regolare attività fisica (esempio una camminata di mezz'ora) e seguire un'alimentazione equilibrata. Assuma gli antidolorifici o integratori di magnesio e potassio solo se consigliati dal medico o dal farmacista e contatti l'équipe curante se i sintomi persistono.

❖ Abbassamento dei globuli bianchi

Curare con attenzione l'igiene personale e orale, usando uno spazzolino morbido. Segnalare eventuali macchie bianche/afte in bocca. Disinfettare bene le ferite. Contatti subito il reparto di oncologia/ematologia o la guardia medica se la temperatura supera 38 °C.

Contattare il Medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti, dopo 4 scariche/episodi di vomito nella giornata.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha febbre sopra 38,5 °C, tosse persistente o dolore a urinare.
- Ha respiro corto, tosse, affanno e gambe o braccia gonfie (edema)
- Ha una sensazione di intorpidimento o formicolio della bocca, delle mani e dei piedi.
- Ha mal di testa, confusione mentale, problemi visivi.
- Ha dolore muscolare/osseo che non permette di svolgere le attività quotidiane.

Se si manifestano sanguinamenti o lividi inattesi in assenza di ferite

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



Questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.



Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.