

IMBRUVICA

(ibrutinib)

SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

CONTATTI UTILI

Farmacia: _____

Reparto: _____

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO



Assuma il farmaco ogni giorno, senza giorni di pausa, salvo diversa indicazione del medico.

TERAPIA CONTINUATIVA

OGNI GIORNO

ALLA STESSA ORA



Assumere il farmaco con un bicchiere d'acqua.

QUANTO? QUANDO? A CHE ORA? CON IL CIBO?

CAPSULE da
____ mg

1 VOLTA AL
GIORNO

SEMPRE ALLA
STESSA ORA

CON O SENZA
CIBO



Le capsule devono essere deglutite INTERE.

Non devono essere dissolte, aperte o masticate.

Nel caso di difficoltà ad assumere le capsule intere contattare il medico o il farmacista.



Se dimentica una dose: Se dimentica una dose, questa può essere presa il più presto possibile il giorno stesso, ritornando all'orario normale il giorno seguente.

Non assuma una dose doppia per compensare la dose dimenticata.

INFORMAZIONI UTILI



Contattare il Medico o il Farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori.

NON ASSUMERE preparazioni contenenti Erba di San Giovanni.

Evitare integratori contenenti olio di pesce o vitamina E.

Evitare pompelmo, succo di pompelmo e arance amare durante il trattamento.



Non guidi né usi macchinari se avverte capogiri, stanchezza, sonnolenza, vertigini o visione offuscata dopo avere assunto il farmaco.



Il farmaco **NON** deve essere utilizzato durante la gravidanza. Se lei è una donna in età fertile, durante il trattamento con ibrutinib e per i tre mesi successivi l'ultima dose dovrà utilizzare metodi contraccettivi efficaci. Chieda consiglio al suo Medico.



Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire autonomamente, contatti il suo team di cura.

❖ **Diarrea**

Bere spesso per reintegrare i liquidi e fare piccoli pasti con cibi semplici e leggeri. Eviti cibi grassi o piccanti, alcol e caffeina. Prenda i farmaci contro la diarrea solo su indicazione del medico. Contatti il medico se ha più di 3 scariche al giorno o se la diarrea dura oltre 24 ore nonostante i farmaci. Non assumere integratori che contengono *Saccharomyces boulardii*.

❖ **Dolore articolari e muscolari e mal di testa**

Per dolori muscolari o articolari può essere utile mantenere, se possibile, una regolare attività fisica (esempio una camminata di mezz'ora) e seguire un'alimentazione equilibrata. Assuma gli antidolorifici o integratori di magnesio e potassio solo se consigliati dal medico o dal farmacista e contatti l'équipe curante se i sintomi persistono.

❖ **Abbassamento dei globuli bianchi**

Curare con attenzione l'igiene personale e orale, usando uno spazzolino morbido. Segnalare eventuali macchie bianche/afte in bocca. Disinfettare bene le ferite. Contatti subito il reparto di oncologia/ematologia o la guardia medica se la temperatura supera 38 °C.

❖ **Sanguinamento/ematomi/macchioline rosse sulla pelle (petecchie)**

Cerchi di evitare traumi, di soffiare il naso delicatamente e usare uno spazzolino a setole morbide. Controlli la comparsa di lividi, petecchie o perdite di sangue da naso o bocca e non assumere farmaci di propria iniziativa, in particolare antinfiammatori, senza aver consultato il medico.

❖ **Eruzione cutanea, prurito, dermatite, fotosensibilità**

Protegga la pelle dal sole, evitando l'esposizione nelle ore più calde, usando indumenti protettivi e una protezione solare 50+. Per l'igiene usi acqua tiepida, detergenti delicati senza alcol e creme idratanti; eviti di grattarsi e segua le indicazioni dell'équipe curante se i sintomi peggiorano. Eviti l'uso di smalto per unghie e tenga le unghie limate ma non troppo corte.

Contattare il Medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti (dopo 4 scariche/episodi di vomito nell'arco della giornata).
- Ha difficoltà a respirare, dolore toracico e palpitazioni.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha tachicardia o battito cardiaco irregolare, pressione sanguigna sopra i 170mmHg.
- Ha febbre sopra i 38,5°C, dolore a urinare, tosse persistente.
- Ha dolore muscolare/osseo che non permette di svolgere le attività quotidiane.

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



- Questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.
- Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.