

IMATINIB

CONTATTI UTILI



Farmacia: _____

Reparto: _____

SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO



Assuma il farmaco ogni giorno, senza giorni di pausa, salvo diversa indicazione del medico.

TERAPIA CONTINUATIVA

OGNI GIORNO

ALLA STESSA ORA



+



Assumere durante un pasto, con un abbondante bicchiere d'acqua

QUANTO?

QUANDO?

A CHE ORA?

CON IL CIBO?

COMPRESSE da
____ mg

1 VOLTA AL
GIORNO

SEMPRE ALLA
STESSA ORA

ASSUMERE
DURANTE IL PASTO



In caso di difficoltà a deglutire le compresse, queste **possono essere disperse in acqua non gassata o succo di mela.**

Utilizzare circa 50 mL di liquido per ogni compressa da 100 mg o 200 mg per ogni compressa da 400 mg.

Mescolare con un cucchiaino e **assumere appena le compresse sono sciolte.**



Se dimentica una dose: non assuma la dose dimenticata. Assuma la dose successiva il giorno seguente come previsto.

Non assuma una dose doppia per compensare la dose dimenticata.

INFORMAZIONI UTILI



Contattare il medico o il farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori. NON ASSUMA prodotti contenenti Erba di San Giovanni (iperico) durante il trattamento.



Non guidi né usi macchinari se avverte capogiri, stanchezza, sonnolenza, vertigini o visione offuscata dopo avere assunto il farmaco.



Il farmaco NON deve essere utilizzato durante la gravidanza. Se lei è una donna in età fertile, durante il trattamento con Imatinib e per i quindici giorni successivi l'ultima dose dovrà utilizzare metodi contraccettivi efficaci. Chieda consiglio al suo medico.



Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire autonomamente, contatti il suo team di cura.

❖ **Abbassamento dei globuli bianchi**

Curare con attenzione l'igiene personale e orale, usando uno spazzolino morbido. Segnalare eventuali macchie bianche/afte in bocca. Disinfettare bene le ferite. Contatti subito il reparto di oncologia/ematologia o la guardia medica se la temperatura supera 38 °C.

❖ **Sanguinamento/ematomi/macchioline rosse sulla pelle (petecchie)**

Cerchi di evitare traumi, di soffiare il naso delicatamente e usare uno spazzolino a setole morbide. Controlli la comparsa di lividi, petecchie o perdite di sangue da naso o bocca e non assumere farmaci di propria iniziativa, in particolare antinfiammatori, senza aver consultato il medico.

❖ **Diarrea**

Bere spesso per reintegrare i liquidi e fare piccoli pasti con cibi semplici e leggeri. Eviti cibi grassi o piccanti, alcol e caffeina. Prenda i farmaci contro la diarrea solo su indicazione del medico. Contatti il medico se ha più di 3 scariche al giorno o se la diarrea dura oltre 24 ore nonostante i farmaci. Non assumere integratori che contengono *Saccharomyces boulardii*.

❖ **Dolori articolari e muscolari e mal di testa**

Per dolori muscolari o articolari può essere utile mantenere, se possibile, una regolare attività fisica (esempio una camminata di mezz'ora) e seguire un'alimentazione equilibrata. Assuma gli antidolorifici o integratori di magnesio e potassio solo se consigliati dal medico o dal farmacista e contatti l'équipe curante se i sintomi persistono.

Contattare il Medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti (dopo 4 scariche/episodi di vomito nell'arco della giornata).
- Ha difficoltà a respirare, dolore toracico e palpitazioni.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha tachicardia o battito cardiaco irregolare, pressione sanguigna sopra i 170mmHg.
- Hai febbre sopra i 38,5°C, dolore a urinare, tosse persistente.
- Ha dolore muscolare/osseo che non permette di svolgere le attività quotidiane
- Ha mal di testa, confusione mentale, problemi visivi
- Ha una sensazione di intorpidimento o formicolio della bocca, delle mani e dei piedi.
- Gonfiore intenso, per esempio delle caviglie, occhi gonfi, improvviso aumento di peso

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



- Questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.
- Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.

