

LORVIQUA

(lorlatinib)

CONTATTI UTILI




Farmacia: _____

Reparto: _____

SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO

Assuma il farmaco ogni giorno, senza giorni di pausa, salvo diversa indicazione del medico.



QUANTO?	QUANDO?	A CHE ORA?	CON IL CIBO?
___ COMPRESSA/E da _____ mg	1 VOLTA AL GIORNO	SEMPRE ALLA STESSA ORA	CON O SENZA CIBO



- LORVIQUA è per uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere (**NON** devono essere masticate, schiacciate o divise prima della deglutizione). **NON** deve essere ingerita alcuna compressa che sia rotta, incrinata o comunque non integra.



- Se dimentica una dose di LORVIQUA, deve essere assunta non appena si ricorda. Se mancano meno di 4 ore alla dose successiva, **NON** assuma la dose dimenticata. **NON** assuma 2 dosi contemporaneamente per compensare la dose dimenticata.
- In caso di vomito dopo la somministrazione di una dose di LORVIQUA, assumi la dose successiva all'orario stabilito.
- Se prende più LORVIQUA di quanto previsto, contatti il medico appena possibile e prima della dose successiva.

INFORMAZIONI UTILI



Contatti il medico o il farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori.
Non assumi erba di San Giovanni/ipérico o succo di pompelmo durante il trattamento.



Questo farmaco altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Si raccomanda cautela nel guidare veicoli o nell'usare macchinari.



Le donne e gli uomini che usano questo farmaco devono usare un metodo contraccettivo efficace, come un metodo di barriera o un altro metodo altamente affidabile per prevenire una gravidanza per almeno 14 settimane dopo la fine della terapia. Il farmaco non deve essere usato durante la gravidanza o l'allattamento.

COSA FARE IN CASO DI...

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire a domicilio, contatti il suo team di cura.

❖ Diarrea

Bere spesso per reintegrare i liquidi e fare piccoli pasti con cibi semplici e leggeri. Eviti cibi grassi o piccanti, alcol e caffeina. Prenda i farmaci contro la diarrea solo su indicazione del medico. Contatti il medico se ha più di 3 scariche al giorno o se la diarrea dura oltre 24 ore nonostante i farmaci. Non assumere integratori che contengono *Saccharomyces boulardii*.

❖ Affaticamento/Astenia

È normale che durante la terapia si possa sentire affaticato/a. Organizzi la giornata alternando attività e pause, riposi quando ne sente il bisogno e cerchi di mantenere un sonno regolare, una buona alimentazione e una corretta idratazione. Se la stanchezza è marcata, eviti di guidare o usare macchinari.

❖ Eruzione cutanea

Protegga la pelle dal sole, evitando l'esposizione nelle ore più calde, usando indumenti protettivi e una protezione solare 50+. Per l'igiene usi acqua tiepida, detergenti delicati senza alcol e creme idratanti; eviti di grattarsi e segua le indicazioni dell'équipe curante se i sintomi peggiorano. Eviti l'uso di smalto per unghie e tenga le unghie limate, non appuntite e non troppo corte.

❖ Edema/Gonfiore alle articolazioni

Se nota gonfiore o pesantezza insolita a braccia o gambe, informi il medico. Per ridurre il fastidio può tenere le gambe sollevate e indossare abiti comodi e calzini non stretti; non assumere integratori per la circolazione/salute dei vasi sanguigni senza aver consultato il medico o il farmacista.

Contattare il Medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti, dopo 4 scariche/episodi di vomito nella giornata.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha febbre sopra 38,5 °C, tosse persistente o dolore a urinare.
- Ha difficoltà a respirare, dolore toracico, palpitazioni, battito irregolare o svenimento.
- Ha problemi di linguaggio, difficoltà a parlare, compreso un linguaggio indistinto o lento
- Ha cambiamenti di umore o problemi di memoria, aggressività, ansia, episodi di confusione o perdita di contatto con la realtà

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare per la conservazione.



Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.