

TAGRISSE

(osimertinib)

CONTATTI UTILI




Farmacia: _____

Reparto: _____

SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO

Assuma il farmaco ogni giorno, senza giorni di pausa, salvo diversa indicazione del medico.



QUANTO?	QUANDO?	A CHE ORA?	CON IL CIBO?
1 COMPRESSA da _____ mg	1 VOLTA AL GIORNO	SEMPRE ALLA STESSA ORA	CON O SENZA CIBO



- Le compresse devono essere assunte intere. Non masticare, non frantumare, non dividere le compresse.
- Se ha difficoltà a ingerire la compressa, può metterla in 50 mL di acqua naturale non frizzante, mescolare senza frantumarla e bere subito. Poi risciacqui il bicchiere con altri 50 mL di acqua e beva.
- Se dimentica una dose: la prenda appena se ne ricorda. MA se mancano meno di 12 ore alla dose successiva, non prenda la dose dimenticata e assuma la successiva all'orario previsto. Non prenda una dose doppia.
- Se vomita dopo aver preso il farmaco, non prenda un'altra dose e assuma la successiva all'orario previsto.
- Se prende più TAGRISSO di quanto previsto, contatti il medico appena possibile e prima della dose successiva.



INFORMAZIONI UTILI



Contatti il medico o il farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori.

Non assuma erba di San Giovanni/ipérico durante il trattamento.



Il farmaco non influenza o influenza in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o usare macchinari.



Le donne e gli uomini che usano questo farmaco devono usare un metodo contraccettivo efficace, come un metodo di barriera o un altro metodo altamente affidabile per prevenire una gravidanza. Il farmaco non deve essere usato durante la gravidanza o l'allattamento.

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire a domicilio, contatti il suo team di cura.

❖ Diarrea

Bere spesso per reintegrare i liquidi e fare piccoli pasti con cibi semplici e leggeri. Eviti cibi grassi o piccanti, alcol e caffeina. Prenda i farmaci contro la diarrea solo su indicazione del medico. Contatti il medico se ha più di 3 scariche al giorno o se la diarrea dura oltre 24 ore nonostante i farmaci. Non assumere integratori che contengono *Saccharomyces boulardii*.

❖ Pelle e unghie

Protegga la pelle dal sole, evitando l'esposizione nelle ore più calde, usando indumenti protettivi e una protezione solare 50+. Per l'igiene usi acqua tiepida, detergenti delicati senza alcol e creme idratanti; eviti di grattarsi e segua le indicazioni dell'équipe curante se i sintomi peggiorano. Eviti l'uso di smalto per unghie e tenga le unghie limate, non appuntite e non troppo corte.

❖ Bocca infiammata o afte

Lavare i denti dopo i pasti con uno spazzolino morbido (da cambiare ogni tre settimane) e fare uno sciacquo con acqua e bicarbonato. Se compaiono bruciore, arrossamento o afte, scegliere cibi morbidi e tiepidi, evitando quelli piccanti, acidi o molto salati, alcol e fumo, e informa il medico. Se necessario, usi la cannuccia per bere.

❖ Abbassamento dei globuli bianchi

Curare con attenzione l'igiene personale e orale, usando uno spazzolino morbido. Segnalare eventuali macchie bianche/afte in bocca. Disinfettare bene le ferite. Contatti subito il reparto di oncologia/ematologia o la guardia medica se la temperatura supera 38 °C.

Contattare il medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti, dopo 4 scariche/episodi di vomito nella giornata.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha febbre sopra 38,5 °C, tosse persistente o dolore a urinare.
- Ha difficoltà a respirare, dolore toracico, palpitazioni, battito irregolare o svenimento.
- Ha respiro corto, tosse, affanno o braccia/gambe molto gonfie.
- Ha grave eruzione cutanea, desquamazione della pelle, dolore/rossore agli occhi o problemi alla vista.

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



Questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.



Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.