

IBRANCE

(palbociclib)

CONTATTI UTILI

Farmacia: _____

Reparto: _____



SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO

Assuma il farmaco una volta al giorno per 21 giorni consecutivi seguiti da 7 giorni di riposo, per un ciclo di 28 giorni.

Ibrance viene assunto assieme a un inibitore dell'aromatasi o a fulvestrant secondo indicazione medica

TERAPIA PER 21 GIORNI

OGNI GIORNO PER
21 GIORNI

POI 7 GIORNI DI
PAUSA



QUANTO?

1 COMPRESSA
da _____ mg

QUANDO?

1 VOLTA AL
GIORNO PER 21
GIORNI

A CHE ORA?

SEMPRE ALLA
STESSA ORA

CON IL CIBO?

CON O SENZA CIBO



- Le compresse devono essere assunte intere. Non masticare, non frantumare, non dividere le compresse. Non deve essere ingerita alcuna compressa che sia rotta, danneggiata o comunque non integra.



- Se dimentica una dose o vomita, prenda la dose successiva come programmato. Non prenda una dose doppia per compensare le compresse dimenticate.
- Se prende più IBRANCE di quanto previsto, contatti il medico appena possibile e prima della dose successiva.

INFORMAZIONI UTILI



Contatti il Medico o il Farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori.

Non assuma pompelmo o succo di pompelmo.



Il farmaco influenza in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. Se si sente insolitamente stanco, presti particolare attenzione durante la guida o l'utilizzo di macchinari



Le donne e gli uomini che usano questo farmaco devono usare un metodo contraccettivo efficace, come un metodo di barriera o un altro metodo altamente affidabile per prevenire una gravidanza. Il farmaco non deve essere usato durante la gravidanza o l'allattamento.

COSA FARE IN CASO DI...

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire a domicilio, contatti il suo team di cura.

❖ **Nausea, vomito e perdita dell'appetito**

Bere a piccoli sorsi durante la giornata e fare pasti piccoli e frequenti con cibi secchi e leggeri, evitando alimenti grassi, dolci o speziati. Prendere i farmaci contro il vomito (antiemetici) che le hanno prescritto e contatti il medico se nausea o vomito persistono anche dopo aver preso i farmaci antiemetici. Non usare integratori contro la nausea senza consultare il medico o il farmacista..

❖ **Eruzione cutanea, prurito, dermatite, fotosensibilità**

Protegga la pelle dal sole, evitando l'esposizione nelle ore più calde, usando indumenti protettivi e una protezione solare 50+. Per l'igiene usi acqua tiepida, detergenti delicati senza alcol e creme idratanti; eviti di grattarsi e segua le indicazioni dell'équipe curante se i sintomi peggiorano. Eviti l'uso di smalto per unghie e tenga le unghie limate, non appuntite e non troppo corte.

❖ **Affaticamento**

È normale che durante la terapia si possa sentire affaticata. Organizzi la giornata alternando attività e pause, riposi quando ne sente il bisogno e cerchi di mantenere un sonno regolare, una buona alimentazione e una corretta idratazione. Se la stanchezza è marcata, eviti di guidare o usare macchinari.

❖ **Abbassamento dei globuli bianchi**

Curare con attenzione l'igiene personale e orale, usando uno spazzolino morbido. Segnalare eventuali macchie bianche/afte in bocca. Disinfettare bene le ferite. Contatti subito il reparto di oncologia/ematologia o la guardia medica se la temperatura supera 38 °C.

Contattare il Medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti, dopo 4 scariche/episodi di vomito nella giornata.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha febbre sopra 38,5 °C, tosse persistente o dolore a urinare.
- Ha difficoltà a respirare, dolore toracico, palpitazioni, battito irregolare o svenimento.
- Ha respiro corto, tosse, affanno o braccia/gambe molto gonfie.
- Ha grave eruzione cutanea, desquamazione della pelle, dolore/rossore agli occhi o problemi alla vista.

Nota gonfiore, calore e dolore a livello di una gamba

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



Questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.



Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.