

KISQALI

(ribociclib)

CONTATTI UTILI

Farmacia: _____

Reparto: _____



SCHEDA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE

COME ASSUMERE IL FARMACO A DOMICILIO

Assuma il farmaco una volta al giorno per 21 giorni consecutivi seguiti da 7 giorni di riposo, per un ciclo di 28 giorni.

Kisqali viene assunto assieme a un inibitore dell'aromatasi o a fulvestrant secondo indicazione medica

TERAPIA PER 21 GIORNI

OGNI GIORNO PER
21 GIORNI

POI 7 GIORNI DI
PAUSA



QUANTO?

— COMPRESSE
da 200 mg

QUANDO?

1 VOLTA AL
GIORNO PER 21
GIORNI

A CHE ORA?

SEMPRE ALLA
STESSA ORA

CON IL CIBO?

CON O SENZA CIBO



Le compresse devono essere assunte intere, preferibilmente al mattino. Non masticare, non frantumare, non dividere le compresse. Non deve essere ingerita alcuna compressa che sia rotta, danneggiata o comunque non integra.



In caso di vomito dopo l'assunzione della dose o se dimentica di prendere una dose, salti la dose dimenticata di quel giorno. Prenda la dose successiva il giorno successivo al solito orario. Non prenda una dose doppia per compensare la dose dimenticata.

Se prende più KISQALI di quanto previsto, contatti il medico appena possibile e prima della dose successiva.

INFORMAZIONI UTILI



Contatti il medico o il farmacista prima di assumere nuovi farmaci e/o integratori.
Non assuma pompelmo o succo di pompelmo.
Non usi questo medicinale se è allergico alle arachidi o alla soia.



Il trattamento può causare stanchezza, capogiri o sensazione di capogiro. Si consiglia di essere prudenti durante la guida o nell'utilizzo di macchinari durante il trattamento con Kisqali.



Le donne e gli uomini che usano questo farmaco devono usare un metodo contraccettivo efficace, come un metodo di barriera o un altro metodo altamente affidabile per prevenire una gravidanza. Il farmaco non deve essere usato durante la gravidanza o l'allattamento.

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, anche se non tutte le persone li manifestano.

La comparsa e l'intensità degli effetti collaterali possono variare da persona a persona. Segua le indicazioni ricevute. Se compaiono sintomi per i quali non ha ricevuto istruzioni, o se i sintomi sono troppo intensi da gestire a domicilio, contatti il suo team di cura.

❖ Nausea, vomito e perdita dell'appetito

Bere a piccoli sorsi durante la giornata e fare pasti piccoli e frequenti con cibi secchi e leggeri, evitando alimenti grassi, dolci o speziati. Prendere i farmaci contro il vomito (antiemetici) che le hanno prescritto e contatti il medico se nausea o vomito persistono anche dopo aver preso i farmaci antiemetici. Non usare integratori contro la nausea senza consultare il medico o il farmacista.

❖ Capogiri

SI alzi lentamente e faccia attenzione nei cambi di posizione per ridurre il rischio di capogiri. Se le vertigini persistono, contatti l'équipe curante.

❖ Tosse

Se compare tosse, misuri la febbre e osservi se il respiro diventa più rapido o faticoso. In presenza di difficoltà respiratoria o altri sintomi importanti, contatti l'équipe curante.

❖ Abbassamento dei globuli bianchi

Curare con attenzione l'igiene personale e orale, usando uno spazzolino morbido. Segnalare eventuali macchie bianche/afte in bocca. Disinfettare bene le ferite. Contatti subito il reparto di oncologia/ematologia o la guardia medica se la temperatura supera 38 °C.

Contattare il Medico se:

- Ha vomito o diarrea persistenti, dopo 4 scariche/episodi di vomito nella giornata.
- Non riesce a bere almeno mezzo litro di acqua al giorno o non riesce a mangiare per più di due giorni.
- Ha febbre sopra 38,5 °C, tosse persistente o dolore a urinare.
- Ha difficoltà a respirare, dolore toracico, palpitazioni, battito irregolare o svenimento.
- Ha respiro corto, tosse, affanno o braccia/gambe molto gonfie.
- Ha grave eruzione cutanea, desquamazione della pelle, dolore/rossore agli occhi o problemi alla vista.

INFORMAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO



Questo medicinale non richiede condizioni particolari di conservazione.



Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti negli appositi contenitori dedicati allo smaltimento dei farmaci.